

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-03-98146089



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 4
du 8 Mars 1993

ARBRES FRUITIERS

Situation générale des stades phénologiques A.R.E.F.L.E.C. et S.R.P.V.

Pêches, Nectarines

Variétés précoces - D.E. quelques F en plaine.
Variétés de saison B.C.

Abricotiers

Variétés précoces C et D.
Variétés de saison B.

Cerisiers

Stade A à B.

Pruniers Japonais

Black Gold = début de floraison 15% de F ouvertes
Black Diamond, début de floraison 20%.

Amandiers

Ferragnes	E à F	sensible au Fusicoccum
Ferrastar	C à D	
Ferraduel	C à D	

Pruniers d'Ente

Stade B à C.

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur-Gérant : G.FELICI

Abonnement Annuel : à
Régisseur de Recettes

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD

S. I. S. S. N.
7 39 - 9633

S. R. P. V.

PECHERS NECTARINIERS

Il est temps de renouveler les traitements "cloque" après les pluies de la semaine passée.

Captane 250 grs M.A/hl

Ferbame	175	"	")	ne pas mélanger avec des produits cupriques
Thirame	200	"	")	
Zirame	180	"	")	

Attention la rémanence de ces fongicides n'exède pas 10 à 12 jours ; les traitements sont à renouveler tous les 15 jours au maximum.

Les pêchers sont sensibles à la "cloque" du stade B à l'étalement des feuilles.

Pucerons

Si les traitements préconisés dans notre bulletin n°2 contre les femelles fondatrices ont été réalisés, ne pas renouveler. Dans le cas contraire, observer leur présence sur les rameaux. Si fleurs ouvertes, inutile de traiter au risque d'augmenter la résistance des "myzus" aux insecticides.

ABRICOTIERS

Attention au monilia dès le stade E au stade G.

B.M.C. :

Benlate	0,06 kg/hl
Sandomil	" "
Pelt 44	0,15 l/hl

I.B.S. :

Anvil	0,06 l/hl
Atemi 10 pepite	0,012 kg/hl
Baycor 300 E C	0,1 l/hl
Baytan 5 " "	0,2 l/hl
Dorado	0,025 l/hl
Olymp	0,04 l/hl
Systhane 12	0,06 l/hl
Systane 6 w	0,125 l/hl
Cryptox	0,175 l/hl
Denarin	"
Funginex	"
Saprol	"

* Alternier les B.M.C. avec les I..B.S.

I.C. Dans les risques graves

Kidan	0,3 l/hl
Rovral	0,15 kg/hl
Sumixclex	0,15 kg ou 1l/hl.
Ronilan	0,1 kg